

醫心方卷第十六

從五位下行 賦博士 魚丹波介丹波宿祢 康賴 撰

治丁創方第一

治犯丁創方第二

治毒腫方第三

治風毒腫方第四

治風腫方第五

治契腫方第六

治氣腫方第七

治氣痛方第八

治惡脈腫方第九

治惡肉方第十

治牙痛方第十一

治編病方第十二

治癰瘰方第十三

治癰瘰方第十四

即果又

於部又頸腫也

治丁創方第一

治毒腫方第三

治風腫方第五

治氣腫方第七

治惡脈腫方第九

治牙痛方第十一

治癰瘰方第十三

治瘤方第十五

治狼瘡方第十七

治蜈蚣瘡方第十九

治蜂蟻瘡方第二十一

治浮沮瘡方第二十三

治轉脈瘡方第二十五

治蛇蝎瘡方第二十七

治蝎瘡方第二十九

治蛙瘡方第三十一

治蟻蟯瘡方第三十三

治石瘡方第三十五

治內瘡方第三十七

治冷瘡方第三十九

治丁創方第一

治犯丁創方第二

治風毒腫方第四

治契腫方第六

治氣痛方第八

治惡肉方第十

治編病方第十二

治瘰方第十四

治諸瘰方第十六

治鼠瘰方第十八

治蜂瘰方第二十

治蟻蟯瘰方第二十二

治瘰瘰瘰方第二十四

治鼠瘰瘰方第二十六

治蟻瘰瘰方第二十八

治蟻瘰瘰方第三十

治蟻瘰瘰方第三十二

治雀瘰瘰方第三十四

治風瘰瘰方第三十六

治膿瘰瘰方第三十八

病源論云丁創者風邪毒氣搏於肌肉所生也初如

風癰搔破青黃汁出裏有赤黑脈亦有全不令人知

忽以衣物觸及卒著痛如有肉突起如魚眼赤黑又結

皆變爛成創下有深孔如火灼穿之狀初作時安

赴如迴厨蓋故謂之丁創令人惡寒四肢強痛創便

變雄黑色腫大光赴根強酸痛皆其候也在手

足頭面骨節間者最急其餘處則可也毒入腹則

病源論云丁創者風邪毒氣搏於肌肉而生也初如
風癰搔破青黃汁出裏有赤黑脉亦有全不令人知

忽以衣物觸及手著痛如有肉案起如魚眼赤黑文結
皆變爛成創下有深孔如火針穿之狀初作時安

赴如迴厨蓋故謂之丁創令人惡寒四肢強痛創便
變雄黑色腫大光起根強酸痛皆其候也在手

足頭面骨節間者最急其餘處則可也毒入腹則
煩悶不佳或如醉如此者二三日便死也

養生方云人汙入酒食內食之作丁創
凡有丁創一創頭烏而強二創頭白而腫實三創

頭如豆紫色四創似葩紅色五創頭內黑脉六創頭赤紅
而浮虛七創頭葩而黃八創如薄色九創頭如茱萸

十創頭似石榴子
千金方云論日夫瘰癧之類須存攝養將息夫所百

病萌生故四時代謝陰陽通與此之二氣更相擊怒當
時也必有暴氣去暴氣者每月之中必有平然大風

大霧大寒大熱若不將避人忽遇之此皆入人四體
損折皮膚溢溢經脉逆使湊理擁障營結滯陰陽

之氣不得宣寫變成癰疽疔毒要瘡諸腫至丁腫若
不預治令人死不遇辰若託乃欲求方其人已入木

矣所以養生之士若早識此方九是瘡瘰無所逃矣
又云一麻子丁其狀如豆上起頭大如黍米色少為中

四邊微赤多瘡忌食麻子及衣布并入麻田中
行
今案錄驗方云大如黍米
粒頭里有部將求完色不異

二石丁其狀皮肉相連色烏黑如為豆甚難判不入
穴內瘡微疼忌凡靨埤石之屬
今案錄驗方云頭
黑瘰癧下瘡如堅
有部將求四
畔作瘡泥將求起色黃大

黃帝八十
難經云五五
營氣為衛
王篇云
牛更及
也亦作硬

又云一麻子丁其狀完上起頭大如黍米色少至中

四邊微赤多瘡忌食麻子及衣布并入麻田中

行今案錄驗方云大少如黍米

二石丁其狀皮完相連色烏黑如為豆其甚鞭刺不入

穴內蔭下微疼忌凡靛埔石之屬今案錄驗方云頭

有部將水四

三雄丁其狀宛頭為麻黑四畔作瘡泥漿水起色黃大

如戲孔忌房今案錄驗方云連根加頭黑

四雌丁其狀瘡頭少黃向裏麻黑似灸瘡四畔泥漿

起色赤大如戲孔忌房今案錄驗方頭赤四畔

五火丁其狀如火瘡頭為麻黑四邊有泥漿有有如

赤粟忌火灸今案錄驗方頭黑

六爛丁其狀少黑有瘡中有膿水形大小如匙

面忌契食爛物今案錄驗方大小如拭面

七卅六下其狀頭為浮起形如為豆四畔起大赤今日生

一明生兩三乃至十若滿卅六藥所不治不滿者可

可治俗名黑點忌瞋喜怒恨今案錄驗方頭黑雨

患者即死

八蛇眼丁其狀瘡頭黑皮上浮生形如小豆狀似蛇眼體

大忌惡眼人見之及嫉妬人者之今案錄驗方頭黑

粟

九極膚丁其狀大如匙面遍瘡皆赤有黑粟起忌鹹食

今案錄驗方頭赤麻大如

十水洗丁其狀大如錢形或如戲孔大瘡頭白裏黑麻

外出中鞭忌飲漿水今案錄驗方頭白

十一刀鑱丁其狀瘡間狹如薤葉長一寸側內黑燒爛忌

刺及刀鑱切割今案錄驗方頭三角有

十二浮靨丁其狀瘡體曲圓少許不合長狹如薤葉大

九塩膚丁其狀大如匙形或如匙孔大瘡頭白裏黑廔
今系錄驗方頭赤廔大如小豆赤粟廣多無部

十水洗丁其狀大如匙形或如匙孔大瘡頭白裏黑廔
今系錄驗方頭白廔元部瘡有赤粟

十一刀鑿丁其狀瘡間狹如薤葉長一寸側內黑燒爛忌
今系錄驗方頭三角有

十二浮鉏丁其狀瘡體曲圓少許不合長狹如薤葉大
今系錄驗方頭

內黃外黑白々々裏刺不痛裏黃裏刺痛
今系錄驗方頭

十三牛狗丁其狀完內泥色極不破
今系錄驗方名曰羊丁瘡即有三角有部

右一十三瘡初起必先瘡後痛先寒後熱定寒多
今系錄驗方名曰羊丁瘡即有三角有部

四支沉重頭痛心驚眼花若太重者臨運工者難治其
今系錄驗方名曰羊丁瘡即有三角有部

麻子一種始末唯瘡所錄之忌不得他觸之者難治
今系錄驗方名曰羊丁瘡即有三角有部

其浮鉏牛狗兩種無所禁忌縱不治亦不教人
今系錄驗方名曰羊丁瘡即有三角有部

又云有此病者忌房樁雞魚牛韭蒜葱薑薑胡蘆酒
今系錄驗方名曰羊丁瘡即有三角有部

酢麵葵等又見豹即死大忌
今系錄驗方名曰羊丁瘡即有三角有部

去血付藥氣入針孔中住若不達瘡裏則不相得
今系錄驗方名曰羊丁瘡即有三角有部

又云治一切丁腫方
今系錄驗方名曰羊丁瘡即有三角有部

蒼耳根莖子葉皆得燒作灰酢汁和作泥塗上
今系錄驗方名曰羊丁瘡即有三角有部

本草拾遺曰石黃
汗去雄黃今人取
取中精明者為雄
黃黑者為雄黃

錄驗方云有疔毒瘡
中安熱如魚眼狀
赤黑瘰癧微

骨是寒毒久結
及在此疾也
其爛成瘡下有深孔

蒼耳根莖子葉皆得燒作灰酢酒和作泥塗上ナモミ
不過十易校根出ハルキタヒヤクシヌイ

又方塗雄黃末立愈神驗トコノ
又方芍杞者汁冷飲一二盞弥佳ハクシ

錄驗方云有疔毒瘡中變起如魚眼狀赤黑疼痛徹トホ
骨是寒毒久結及在此疾也其爛成瘡下有深孔シタ

如火穿也初作變起狀如細針蓋故謂疔之毒者耳ナラシ
初作即服湯及諸單行治丹方法便差也北方饒此タカシ

疾也江東時有作者喜著口裏類過及舌上也者ツラ
之口黑如珠子含服湯針刺去血如治丹疽法也ハル

癰疽方治丁瘡方ハル

以背刀割十字以銅鐵搗燒火合赤創上置臍炙燒ハシヤイイカ
刺名曰為礫一二過元毒完時自契止燒罷哭作セバダフアタハルタヒニテ

灰末著創中滿之即差アヒ
又云治惡瘡丁腫五香湯方今案經心方燒
者婆方同之雖赤刺頭上

青木香 董陸香 沉香 丁子香 藿香各一兩
水三升煮取一升半分三服得麝香二分去藿香五元

樣要方治丁創方ハル
搗芫蔚莖葉薄腫上服汁令丁毒內消也一名益母草

百濟新集方治丁腫毒氣已入心欲困死方ハル
取菊葉合莖搗絞取汁三升頓服之ハカ

醫門方療丁毒腫不問雄雌麻子等一切毒腫毒氣
入腹斂人方

頻煮芍杞根汁飲之
又云治丁腫方

白強蟹白蠟石末和封之最佳カヒツ
又方水研白蠟石服一盞并針開瘡傳上自消ハル

經心方治丁腫新方

醫門方療丁毒腫不問雄雌麻子等一切毒腫毒氣入腹斂人方

頻煮苧杞根汁飲之

又云治丁腫方

白強蟹白蠟石末和封之最佳

又方水研白蠟石脂一盞并針開瘡傳上自消

經心方治丁腫新方

末附子酢和塗上煖復塗之

陶景本草注治丁療方

人屎乾者燒之相絕水漬飲汁名破棺湯

獲敬本草注丁瘡方

末白蠟蟹封上根當自出極効

崔禹賜食經丁瘡方

搗招莖菜根傳之瘡根即拔

普婆方治一切疔瘡神方

以磴磴末少付即老

又云治人契毒疔瘡在口中方

凝水石搗末研之少以付瘡上日三四付即老

治犯丁創方第二

病源論云犯丁創者謂丁創故老更犯觸之若大瞋

及食猪魚麻子并犯夏人氣燠創皆能犯之則更劇

乃甚於初更令創契折腫先寒後熱契四支沉重頭痛

心驚過迷煩悶則不可治之

千金方云故知犯狀但脊強瘡痛極甚不可得忍

是犯狀治之方

多搗蒼耳汁飲并塗上

又方水四升煮馳脫皮如鷄子大三四沸去滓服三

愈

乃甚於初更令創契折腫先寒後契四支沉重頭痛
心驚過逆煩悶則不可治之

千金方云故知犯狀但脊強瘡痛極甚不可得忍
是犯狀治之方

多搗蒼耳汁飲并塗上
天方水四升煮蛇脫皮如鷄子大三四沸去滓服三

又云若犯者

取苟把根切三升以水五升煮取一升取滓研一
上和汁一盞服之日二三服并單飲冷汁一二
盞亦佳

醫門方療犯丁腫欲死者方

搗菊葉取汁服之冬月取根神驗

歷驗方治患丁瘡犯欲死方

取慈石和酢封五枚根出

又方石流黃燒臙署之

又方酢練磨礪石遍傳之三署

又方取冬葵子服方寸匕日二

救急單驗方療犯丁瘡根入腹欲死方

取東行脂又并和真和水絞汁飲一升卷

又云已死者

取大黃龍湯一升煖之以木杓口灌即治甚驗

治毒腫方第三

病源論云毒腫之狀與風腫不殊時令人張契其

耶毒甚者入腹斂人

經心方治毒腫五香湯方

沉香青木香陳薰香各一兩丁香各一兩麝香半兩五

味以水五升煮取一升半分三服

本草替段目人屎
水滑竹屎主諸毒
新者和水服
一升最好陳
人者名黃龍湯

黃龍湯
本草和名曰
陶一云明中
積年得之
其黑而苦者
也其一名云
精

本草和名曰
陶一云明中
積年得之
其黑而苦者
也其一名云
精
耶大黃龍湯一升燉之以木杵口津服之甚驗
病源論云毒腫之狀與風腫不殊時令人悲其
耶毒甚者入腹斂人
新和服
外最好陳
人者名黃龍湯
治毒腫方第三

經心方治毒腫五香湯方

沉香 青木香 薰香 丁香 各一兩 麝香半兩五
味以水五升煮取一升半分三服

劉涓子方五香丸治惡氣腫毒方

薰陸香二分 霍香二分 青木香三分

鷄舌香二分半 鬼臼二分 大黃八分 當歸五分

升麻三分 朱沙一分半 牡丹二分 雄黃一分

右十一物搗下篩蜜和為丸清白飲一服四九如

小豆大日每

又云五毒膏治惡氣毒腫方

蜀椒二兩 當歸二兩 朱沙二兩 烏頭一升

苦酒一升半 猪肪六斤 巴豆一升 雄黃二兩

右八物吹咀以苦酒淹一宿內猪肪合煎微火三

上三下藥成向火摩腫上日三

集驗方治風契毒腫結赤夜干膏方

夜干二兩 常陸切一升 防已四兩 升麻三兩

四物切以猪膏三升微火並常陸小雄黃候去滓

以摩病上

葛氏方治卒患毒腫柴稍廣急痛方

燒牛矢末以苦酒和傳上燄復搜

又方搗荏苒子如泥塗上燄復搜之

又方以苦酒升麻及青木香並真檀合磨以指

塗痛處良

本草和名曰
味鹹微寒至惡
毒風毒

葛氏方治卒患毒腫柴稍廣急痛方

燒牛矢末以苦酒和傳上煅復按

又方搗荏苒子如泥塗上煅復按之

本草曰紫真檀味鹹微寒至惡毒風毒

又方以苦酒外麻及青木香紫真檀合磨以拍塗痛家良

又方但以甘刀破上波去毒血乃傳藥亦佳

今系取水蛭令啗去惡血其方在治癰疽之方

千金方治惡毒腫或著陰卵或偏著一邊疼急痛變

牽入少腹不可忍一宿斂人方

取迴香草搗取汁飲一升日三四服滓薄腫此外

國神方從元嘉末來用之起死人神驗

救急單驗方療一切惡腫疼痛不可忍無間冷熱大

少方取葭若子三枚揅熟按勿令破吞之驗

孟詵食經毒腫方

末赤少豆和雞子白薄之五卷

陶景本草注毒腫方

煮青木香浴大佳 又方服藍汁

治風毒腫方第四

病源論云風毒腫者其先赤痛癰熱腫上生瘰癧

如火灼是也

小品方云有風熱毒相薄為腫其次先腫熱熱上生瘰

小品方云有風熱瘰癧忽生瘰癧如拂湯膿

葛氏方若風毒兼改通身漸腫者方

生苦參昌蒲根三白根剉各一斗以水一石五斗煮

取一斗去滓內好酒一斗溫服半升日三次洗目

樣要方療風毒初腫令消方

大黃二兩亭歷子二兩葵通草二兩莽草二兩

右為散水煎傳腫上赤湯之神効

小品方云有風毒者名風契毒也治之如治丹毒法也
瘡身上
忽生瘡癰如
佛湯膿也

葛氏方若風毒兼改通身漸腫者方

生苦參昌蒲根三白根剉各一斗以水一石五斗煮

取一斗去滓內好酒一斗溫服半升日三次洗耳

樣要方療風毒初腫令消方

大黃二兩 亭歷子二兩 葵通草二兩 莽草二兩

右為散水和傳腫上煖湯之神効

耆婆方治人風腫在皮上教有時方

升麻三兩 夜于二兩 夕藥二兩

三味切以水三升煮取一升分三服

治風腫方第五

病源論云風腫者腫無頭无根浮在皮上如吹也不

赤不痛移元常覆而兼瘡由腠理虛而逢風所作

葛氏方云凡毒腫多痛風腫多痒按之隨手起或非

瘰癧輒皆風腫治之方

但令人痛以手摩將柝按數百過自消

又方炒蠶矢并塩布裹熨之

又方苦酒摩挂若獨治以傳之

又方猷菜浸水中以裹腫上

又方以斂刀决破之出毒血便愈

經心方白殿怡治風腫毒核癰疽方

白殿二兩 黃芩半兩 茵草半兩 夕藥一兩

黃耆一兩 當歸一兩 大黃半兩 赤石脂二兩

八味為散以鷄子白和如粥塗紙怡上煖湯易

本草云笮草麻子油塗之

治契腫方第六

病源論云其契毒作者急無改頭但急腫色赤而特惡

寒此契煩均不妄

本草云

竹葉麻子油塗之

治契腫方第六

病源論云其契毒作者急無改頭但急腫色赤而特惡寒此契煩肉不互

極要方療契毒腫秘之不傳方

皂莢刺一握去兩頭

石以水一大升煮取半升去滓頓服之取痢其腫如湯洗雪

又云療一切契毒腫忽發頸項背上即封不成膿

方

生地黄二升 香豉半升 芒消五兩

石鴉令契以傳腫上厚二分日五六付消心

救急單驗方療契毒腫方

取來樹東南根下土和水作泥餅安腫上以艾灸之取契應即止男女並同

廣濟方療契毒腫方

取牛脇骨燒為灰以大酢和如泥塗上乾易

普婆方治人契腫疼痛方

升麻三兩 夜干二兩 大黃二兩 芒消二兩

青木香二兩 文子一兩 甘草半兩

七味對以水六升煮取三升內芒消攪令調分

三服得下利即差

治氣腫方第七

病源論云氣腫病者其狀如癰無頭虛腫色不變皮上忽手攪暑便即痛是也此風邪搏於氣所生也

升麻三兩 夜干二兩 大黃二兩 芒消二兩
青木香二兩 文子一兩 甘草半兩
七味對以水六升煮取三升內芒消攪令調分
三服得下利即差

治氣腫方第七

病源論云氣腫病者其狀如癰無頭虛腫色不變皮
上忽手攪著便即痛是也此風邪搏於氣所生也
小品方云有氣腫病其狀如癰無頭虛腫色不變皮上
急痛手攪著便覺痛此由體契當風復被寒令涼
折之結成氣腫也

宜服五香連翹湯今至五香連翹湯在治惡脈之方中自射氣寫之傳疾梨薄亦用小豆
薄並得消也

疾梨薄方

疾梨子二升下篩以麻油和如泥熬令焦黑以漚細
故藥布上剪如腫大勿用頭漚之無疾梨可春
小豆下篩鷄子白和漚腫上乾復漚之並得

消也集驗方同

治氣痛方第八

病源論云氣痛者人身忽然有一處痛發作有時痛
發則小契痛靜便如水霜所加故云氣痛也二由體虛
為風邪所侵遇寒氣而折之耶氣不出故也

小品方云有氣痛病身中忽有一處痛如折標之狀不
可堪耐亦左右走身中發作有時痛發時則小契痛靜
時便覺其象如冷水霜雪所加此皆由冬時受濕風至

春復果寒涼來折之不成溫病乃變作氣痛也

宜先服五香連翹湯數劑及竹瀝湯摩丹赤膏灸
自消其揚柳樹皮暖熨之有赤氣點見象宜鑱去

血也其間將白微散

小品方云有氣痛病身中忽有一處痛如打撲之狀不可堪耐亦左右走身中發作有時痛發時則小契痛靜時便覺其處如冷水霜雪所加此皆由冬時受濕風至春復果寒涼來打之不成溫病乃變作氣痛也
宜先服五香連翹湯數劑及竹瀝湯摩丹赤膏灸
自酒煮揚柳樹皮暖熨之有赤氣點見處宜鑱去
血也其間將白薇散
小竹瀝湯治氣痛方

淡竹瀝二升夜下二兩杏仁二兩 茵芋半兩
黃芩半兩 白朮二兩 木防已二兩 防風二兩
秦膠二兩 伏苓三兩 麻黃一兩 獨活二兩
枳實二兩 芍藥二兩 甘草二兩

凡十五物吹咀以水九升煮藥折半乃可內竹汁煮取三升分四服少燂入分作五服

自薇散治風契相搏結氣痛左右走身中或有惡脈起者積服湯餘契未平復宜此白薇散以消餘契方

自薇六分 萎蕤四分 當歸四分 麻黃三分
秦膠五分 天門冬分 蜀椒二分 木防已四分
羌活三分 茵草二分 獨活四分 枳實四分
烏頭二分 木六分 人參四分 夜干六分
山茱萸四分 青木香四分 防風六分 白芷三分

凡市物揚下須篩以酢漿服方寸匕漸至二匕日三少燂人隨長少減服之毒微者可用酒也

已上集驗方同之

治惡脈腫方第九

病源論云惡核腫者肉裏忽有核累累如梅李小有如豆粒皮內癢痛左右走身中平然而起此風耶挾毒

八十難經曰凡症日里如人指著珠云

音義并開年各皆勒能似

山錦美寒病也

八七三

白芷三分

日三少嬾人隨長少減服之毒殺者可用酒也

治惡脈腫方第九

八十難經呂氏注曰
病
累如人指
着環云々

山錦王寒病也

射切 小品方曰

毒其形如甲虫云云
因水勢力以射
人云云

小品方云此書有大小
者毒微射人多不昂
作瘡人

大者猶中今
乃予可成
小者
千七百

郎果又

生是後

有毒不

月受溫

宜服五

湯

脉令消

五香連

青

鷄

獨

談

九十三

一

丹參膏

丹

獨

獨活二兩 寄生二兩 大黃三兩 甘草二兩

淡竹瀝二升

凡十三物吹咀以水九升煮藥計水減半許可內竹

瀝汁又剋取三升分三服

丹參膏治惡脉及惡核瘰癧風結諸般腫痛方

丹參二兩 蒴藋根二兩 茵草半兩 秦膠一兩

獨活一兩 鄮躑花半兩 蜀椒半兩 白芨一兩

牛膝一兩 菊華一兩 木防已一兩 烏頭一兩

凡十二物細切為善以苦酒二升漬之一宿復月

半日急疾即藥之以猪膏四升藥令苦酒竭

勿令暴雄發也去滓以膏塗諸疾上日五六至

良

葛氏方治惡核腫結不肯散者方

烏犀根外麻 各二兩

以水三升煮取半升分每服以滓熨上

又方燒白鵝矢以水服三方寸匕以肉薄腫上

又方苦酒摩由跋塗之搗小蒜薄之

錄驗方治惡核腫毒入腹五香湯方

董蔭香射香 沉香 鷄台香 青木香 各二兩

凡五物以水六升煮取二升半適寒溫分作三服

不更復作云令香可盡五香各一兩水四升煮

取三升亦為二服又滓薄腫腫上神良

僧深方凡得惡腫皆暴卒初始大如半梅桃或有核

无核或痛或不痛其長甚速須臾如鷄鴨大即不治

之腫契為進煩向物摩毒內侵填塞血氣息不

通一每宿便教人初覺此病便急宜灸當中央及繞腫

邊灸之令相去五分使周匝腫上可三七壯感者多

壯數為善腫進者逐灸前際取佳乃止

取三升亦為二服又澤薄腫腫上神良

僧深方凡得惡腫皆累平初始大如半梅桃或有核

无核或痛或不痛其長甚速須臾如鷄鴨大即不治

之腫契為進煩肉物牽毒內侵填塞血氣息不

通一每宿便致人初覺此病便急宜灸當中央及繞腫

邊灸之令相去五分使周匝腫上可三七壯盛者多

壯數為差腫進者逐灸前際取佳乃止

又方鯽魚炙薄腫上

又方取鯽魚臄蒜蘆

劉涓子方治惡腫腫毒湯方

烏扇二兩升麻二兩艾子人十四枚破

石三物切以水三升煮取一升半分再服以澤薄

腫上甚良

張仲景方治消核腫黃耆倍方

黃耆三兩真當歸三兩大黃三兩芍藥一兩

白飯三兩黃芩三兩防風三兩夕藥二兩

鷄子十枚黃連二兩

凡十物搗薇以鷄子白和塗紙上貼腫上煖易

又方楊菜葉以囊盛薄敷上亦可令連消用

多得効驗

治惡肉方第十

病源論云惡肉者身裏忽有肉如赤豆粒突出細

長乃如牛馬乳大亦如鷄冠之狀不痛也久不治長不

已春冬被惡風所傷風入肌肉結瘀血積而生也

小品方云有惡肉病身中忽有肉如赤豆粒突出便長

推出不愈如牛馬乳亦如鷄冠狀也不治其為自推出不

肯心亦不痛瘡也此由春冬特受惡風入肌腠中變

成此疾也

病源論云惡肉者身裏忽有肉如赤豆粒突出細

長乃如牛馬乳大亦如鷄冠之狀不痛也久不治長不

已春冬被惡風所傷風入肌肉結瘀血積而生也

小品方云有惡肉病身中忽有肉如赤豆粒突出便長

推出不^カ息如牛馬乳亦如鷄冠狀也不治其為自推出不

肯心亦不痛瘡也此由春冬特受惡風入肌脈中變

成此疾也

治之宜服漏蘆湯外燒鐵礫之日シロコクセ又アリクセ稍礫令雄盡ヤリ

也礫竟以外麻膏傳之積日乃老耳今案漏蘆湯外麻膏

在洛丹之方

治惡脈病方第十一

病源論云惡脈者身裏忽有赤絡脈起竅聚如

死蚯蚓狀者如似有水在脈中長短皆逐其絡脈所出

見是也由春冬受惡風入絡脈中其血瘀結所作也

小品方治惡脈病方

宜服五香連翹湯及竹瀝湯鑷去惡血傳丹參膏

積日則老亦以白雄雞屎塗之集驗方月之

劉涓子方治惡脈腫毒方

馬扇二兩升麻二兩生者用一兩文子十四枚辟破

右三物切以酒三升煮取一升半分為兩服以滓薄

腫上甚良

又云升麻湯治惡脈毒腫方

升麻一兩 吳茱萸一兩 董陸香二兩 鷄香各一兩

雄黃一兩 蟬甲一兩炙 甘草一兩 烏扇三兩

青木香一兩

右九物以水七升煮取二升半適寒溫分三服相去

一里治脈腫神良今案升麻湯又有小品治丹方藥種与此不同

治漏病方第十二

肺筋肉也

又云升麻湯治惡脈毒腫方

升麻一兩 吳茱萸一兩 薑黃一兩 雞香各一兩

雄黃一兩 黃甲一兩 炙甘草一兩 烏扇三兩

青木香一兩

石九物以水七升煮取二升半適寒溫分三服相去

一里治脈腫神良

必思又
筋肉也

治編病方第十二

病源論云編病者由勞役失體熱感因取風冷而為

涼濕所折入於肌肉筋脈結聚所成也其狀赤脈起如

編繩急痛壯熱其發於脚者喜從髁膝起至踝如

如編繩故謂編病也其發於臂者喜腋下起至手

也不即治取其潰去膿則筋牽縮也其著脚若不

治不消復不潰其熱散氣不散變作腫脈緩相薄

腫脇已成膿

黃帝八十一
難經云心脈
出微清

特宜足腫病也所力又不滑也

小品方治脇病方

宜脹漏蘆湯自下外以鋒針數鑿去血氣針傷其結

脈家傳小豆薄則消皆可依治丹法消之只用

治瘻瘻三物甘焦薄也及至潰成膿大針傳膏

散治癰法之千金方

葛氏方治肉平腫起夾長赤痛名曰編方

鹿角一兩 白蔞一兩 杜蘅四兩 附子二兩 炮

石四物下節苦酒和塗帛以帖之于後按之

治瘻瘻方第十三

病源論云風邪毒氣容於肌肉隨虛處而停結為瘻

瘻或如梅李棗芋核大小兩三相連在皮間而時發

寒熱是也久則變膿潰成瘻也

錄驗方云療瘻瘻唯須以針之小者即消大者

即斂然後出膿便愈厚日一針

右四物鳩下節苦酒和塗帛以帖之于瘻後之

治瘻方第十三

病源論云風邪毒氣容於肌肉隨虛亂而停結為瘻
瘻或如梅李棗芋核大小兩三相連在皮間而特發

寒熱是也久則變膿潰成瘻也

錄驗方云瘻瘻唯須以針之小者即消大者

即斂然後出膿便差厚日一針

千金方云一切瘻瘻在項上及陰處但有宗結段似

作瘻及癰痛者方

以獨頭蒜截兩頭却心大作艾炷秤蒜大小帖

瘻子上灸之勿令上破矣但取熱而已並七蒜三

並日之灸之取消心

又方白強蠶為散水服五分日三十日瘻

又方干猫舌末付瘻上

又方狼矢灰付上

醫門方治瘻瘻方

尖針瘻子令穿通以石流黃如豆大艾針中

燒針筋令赤之藥流入瘻中其瘻差即

消極驗也

小品方治卅歲瘻瘻方

海漆一斤消囊盛好清酒二斗漬之春夏二宿

服二合消盡復以酒二斗漬之飲如上法此酒

盡燂海漆令燂末服方寸匕日三服元所禁

一劑不愈更作不過三劑也

宜使速消

劉涓子方治寒熱瘻瘻在頸腋下皆如李大方

人參四分 甘草四分 白芷四分 干薑四分

凡四物皆同分治合節先食服方寸匕日三少

服二合。消盡。復以酒二斗漬之。飲如上法。此酒

盡。爆海漆。令漆末。服方寸匕。日三。藥元所禁。

一劑不愈。更作。不過三劑也。今案葛氏方治頸下瘰癧。累如梅子。

宜使速消

劉涓子方治寒熱瘰癧。在頸腋。下皆如李大方。

人參四分。甘草四分。白芷四分。干薑四分。

凡四物皆同分。治令篩。先食服。方寸匕。日三。少

小服。半方寸匕。良一方。以酒服。龍門方令速消云。

范汪方治瘰癧。朝夕煮。契龍骨散方。

龍骨七分。牡蠣三分。一方分等。

凡二物。治令下篩。先食服。五分匕。日三。龍門方令速消云。

僧深方治諸瘰癧。因瘡生。契方。

白煨灰二升。

石一物。沸湯和。如糜。契以掩其上。甚良。

廣利方療瘰癧。成瘰作孔方。

露蜂房二枚。炙末。和臘月猪塗孔上。

治瘰癧方第十四

病源論云。瘰者。由憂。患氣結。所生。亦由飲沙水。沙

隨氣入於脈。搏於頸下。而成之。初作。与瘰核相似。而

當頸下也。皮寬。不急。垂腿。然是也。患氣結成瘰者。

但垂腿。无肢也。飲沙水成瘰者。有核。癰。无根。浮動在

皮中。又云。有三種瘰。有血瘰。可破之。有骨肉瘰。可

割之。有氣瘰。可具針之。養生方云。諸山水。里上中

出泉流者。不可久居。常食作瘰病。動氣增患。

小品方云。有瘰病者。始作。与瘰核相似。其瘰生。頸

下。當中央。不偏兩邊也。皮寬。不急。垂腿。然則是瘰

也。中國人患氣結瘰者。但垂腿。无肢也。長安及襄陽

瘰人。其飲沙水。害病。沙瘰。有肢。瘰。无根。浮動在

皮中又云有三種癭有血癭可破之有血肉癭可
割之有氣癭可具針之養生方云諸山水里上中
出泉流者不可久居常食作癭病動氣增患

小品方云有癭病者始作与癭脉相似其癭生頸
下當中尖不偏兩邊也皮寬不急垂腿然則是癭
也中國人患氣結癭者但垂腿无脉也長安及襄陽
蠻人其飲沙水喜病沙癭有脉癭无脉癭耳无根浮動在
皮中

治諸癭良方

小麦一斗以淳苦酒一斗漬小麦令糲漉出曝
令燥復漬之苦酒盡曝麦糲擣下篩以海藻
三兩別擣末合治之溫酒服方寸匕日三禁塩生
生菓猪膏生菜數用有驗也
今案龍門方加昆布三兩范汪方云治卅年

瘰癧瘰癧瘰癧

千金方治癭方

昆布二兩切如指大酢漬令咽汁盡則食

又方灸風府穴百壯又灸大椎百壯

又方灸大椎兩邊相去各一寸半少下垂各卅壯

葛氏方治頸下平結果漸大欲成癭方

海藻一升酒二斗漬一宿稍冷一二合咽之酒

盡取滓末服方寸匕日三

范汪方治癭昆布丸方

昆布八兩 海藻八兩 洗

凡二物擣下篩和以蜜丸先食含如半棗大稍

咽之日五服不知稍增以知為度

効驗方治癭昆布丸方

昆布二分 松蘿二分 海藻五分

凡三物治含下篩以白蜜丸如李子含咀嚼

小品方曰風府一穴在頂後髮際下小入髮中當兩筋中夾陷中是也

小品方云大椎上節以上至頸與脊骨相按處其節取高者也

文選上林賦一曰菱藕云

才與及疾略及カ三八

范汪方治癭昆布丸方

昆布八兩オコノエナキヌ 海藻八兩洗

凡二物搗下篩和以蜜丸先食含如半棗大稍咽之口日五服不知稍增以知為度

効驗方治癭昆布丸方

昆布二分 松蘿二分 海藻五分

凡三物治含下篩以白蜜丸如李子含咀嚼才與及 疾略及 カ三八 カ三カラチ

咽其汁日三夜二

槎要方治癭海藻散方

海藻十分 昆布一兩 海蛤一兩ウヅキウカヒ 通草一兩

松蘿一兩 干薑一兩 桂心一兩一方无干薑代白蒼一兩

右七物下篩酒服方寸匕日三

耆婆方治人氣癭方

松蘿二兩 海藻三兩 通草二兩オノノミ 洗 半夏三兩

桂心二兩 海蛤三兩 昆布三兩 干薑六兩

伏苓二兩 細辛三兩 桔梗二兩ミラウチクセ又ヒキウセタセリセ

右十一味搗篩為散以酒服一方寸匕日三

又方炒塩薄之

玉菟方治卅年癭及瘰癧方

海藻八兩ハクリ 貝母二兩 五朮根二兩ウツ 麦麴二分

四味作散酒服方寸匕日三 桂心方同之

廣利方療癭結氣方

昆布二大兩暖水洗去鹹味寸切 小麦三大合

以水二大升煮取小麦熟擇取昆布空腹含三五

行津液細細嚥之日每含ナケヒエタセシニキヲカセシ 忌生冷油膩シツラアリ

治癭方第十五

病源論云癭者皮肉中忽腫起初如梅李大漸長大不

癢不痛又不結強言癭結不散謂之為癭不治乃

廣利方療癰結氣方

昆布二大兩暖水洗去鹹味寸切 小麦三大合

以水二大升煮取小麦熟擇取昆布空腹含三五

行津液細細嚥之忌生冷油膩 日每含

治瘤方第十五

病源論云瘤者皮肉中忽腫起初如梅李大漸長大不

瘡不痛又不結強言瘤結不散謂之為瘤不治乃

至極大則不復痛不能斂人亦慎不可輒破之

范汪方云發腫都軟者血瘤也發腫狀如瓠雖極大

此宗瘤非癰也

千金方治瘤病方

樊石 芎藭 當歸 大黃 黃連 芍藥

白殿 黃芩 吳茱萸 一分

九味為末雞子黃和之塗細故布上隨瘤大

少以薄帛之干即易暑藥當熟作膿暗細

從孔出也按却膿血盡著生宗膏若膿不盡復

起故也

又云生宗膏主癰瘤潰漏及金瘡凡百瘡方

當歸一兩 附子一兩 甘草一兩 白芷一兩

芎藭一兩 生地黄五兩 薤白二兩

七味切以猪脂二升半並白芷黃付之日三僧深方

又云凡宗瘤勿治之斂人慎之

僧深方治血瘤方

廣宗割炭大炙令契掩上榆之令暖炙令宗

燒烙可四灸四易之若不除灸七主便足也

玉菊方楊樹頂治瘤癰方

河邊水所注楊樹根并竹葉洗細柱以水二石煮取

五斗用米三斗麵三升釀之酒成服一升集驗方內之

僧深方治血癰方

玉菊方楊樹首治瘤癭方

治諸痿方第十六

病源論云。瘰癧之生。或因寒契不調。致血氣壅結。所
作ナレ或由飲食キ不節。狼臯之精入於府藏。毒流注脈。變
化シ而生。皆能使血脈結聚。寒契相交ル。久則成膿。而
潰漏也。生身體皮肉者。亦有始結。腫与石癰相似。所可
為異者。其腫之中。按之壘フタタチ。有數脈。毒發於頸邊。俱起
便是瘰癧證也。亦發兩腋下。及兩顙顙間。初作毒不痛。
不契アハカラ。若毒時不即治。生寒契也。所發之亂。而有輕重。
者有兩一則支口上。腫有結核。大小見宜。或如桃李。此
虫之窠窟。正在其中。二則發口之下。元有結核。而穿
潰成創。

又云。重毒之居。或府藏無定。諸痿發身體。亦有數家。

其相通者多死其痿形狀赴發之由今韡干後章

養生方云六月勿食自落地五菓注宿毗踈踈貽踈踈踈

上喜ハ爲九瘻十二月勿食犢鼯ナツル殘肉生創及瘻出頸頭ノコ

及口裏或生咽内也

又云決其死生者及其自視之其中有赤脈從上下貫

瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲

死見二脈半二歲半死見三脈三歲死赤脈而不下

貫瞳子可治也

又云方說九痿者是狼痿鼠痿痿痿痿痿痿痿痿痿痿痿

上喜為九痿十二月勿食狗鼯肉生創及痿出頸頭

及口裏或生咽內也

又云決其死生者及其自視之其中有赤脈從上下貫

瞳子見一脈一歲死見二脈半一歲半死見三脈二歲

死見四脈半二歲半死見五脈三歲死赤脈而不下

貫瞳子可治也

又云方說九痿者是狼痿鼯痿踠痿躄痿躄痿

痿躄痿躄痿躄痿躄痿躄痿躄痿躄痿躄痿躄痿躄痿

又云復有廿六種痿方不次第顯其名而有疏蠅趾

到等諸痿非九痿之名此即是廿六種痿之數也

小品方云有痿者始結腫与石癰相似所可為異者

其一種中板之壘有數脈便是也

初作喜不痛不契即以練石薄傳之內服防已連

翹湯下之便可得消若其時不治結膿者亦以練石

薄令速乾用大尉膏散如治癰法初作即以小

豆薄塗之亦消

又云桐君說赤小豆白蠶黃苓黃耆牡蠣凡五物分等

下篩酒服方寸匕

治癰瘤諸痿昆布丸方

昆布八兩 海藻七兩 少麥一升 葵 海蛤五兩

松蘿四兩 連翹二兩 白頭公二兩

右七物搗下篩和蜜丸如梧子服十九日三稍

丸

千金方云九痿有似石癰壘然作瘰癧子有核在兩頸

及腋下不痛不契者皆練石散付內服五香連翹湯

下之已潰者療如癰法 今案五香連翹湯有治惡脈方

凡頂邊脈下先作瘰癧者故作漏也宜禁五辛酒麵

及諸熱食

右七物。搗下。從和蜜丸。如梧子。服十九日。三稍。每丸。

千金方云。凡瘰癧。有似石。癰壘然。作瘰癧。子有核。在兩頰。及腋下。不痛。不契者。皆練石散。付內服。五香連翹湯。下之。已潰者。瘰癧如癰法。今案五香連翹湯。有治惡瘰癧方。凡頂邊。腋下。先作瘰癧。瘰癧者。故作漏也。宜禁五辛酒。麵及諸熱食。

又云。癰漏方。

搗生章陸根。檢作拌子。置漏上。以艾炷上。拌子契。易之。艾三四升。艾菴。徑心方同之。

又方。亭歷二合。豉一升。二味。合搗。令熟。作餅。如大錢厚。二分許。取一枚。當創孔。心作大艾炷。如小指大。灸。麤上三炷。一易。三麤。九易。日三。障三日。度一灸。

又方。癰瘰。周四畔。即著。

又云。治漏方。

搗土。依根。薄之。燥。復易。不限時節。

又方。燒死。蛻蝦。末。酢和。塗之。

又方。死。蛇。氏。酢和。付之。

葛氏方。通治諸瘰癧方。

取地中。潛行。臭。鼯。一頭。破腹。去腸。干之。火炙令可成屑。末。以鴈月猪脂。和。傳瘰癧上。

又方。燒。瘰癧。貼。作。瘰癧。膏。和。傳之。

又治諸瘰癧。看口裏。齒。頰。間者方。

東行。母。練。根。細。剉。三四升。以水。濃煮。取汁。含之。數吐。易。勿咽之。

耆婆方。治人。卅年。瘰癧。瘡方。

取蒟蒻根。嚼。令。土。燒。根。去。土。大釜中。以水。煮。令。熟。

令可成肩末以臘月猪脂和傳瘡上

又方燒腠貼作瘡猪膏和傳之

又治諸瘰癧又方白大膏燒末以猪膏和傳之口裏齒頰間者方

東行母練根細剉三四升以水濃煮取汁含之
數吐易勿咽之

耆婆方治人卅年瘰癧方

取蒟蒻根九嚼令土燒根去土大釜中以水煮令熟
去滓置大瓮中枝取清汁煎之九若咸復煎九小器
中煎令如薄糊內器中若有痂去之內煎若病
深以鷄毛取煎冷暖軟以內中老乃心取煎蒟
蒻滓舉看其人老而不報是者取滓燒還煮瘰
也秘之

廣濟方療瘰癧久不瘳方

巴豆一兩去皮大棗一升

石以水五升煮取一升絞去滓更煎如稠餲傳瘰

上日三

蜀消子方治瘰癧衆方不瘳効驗方

取杜蒙數兩搗之湯和過寒溫取一升許薄瘰
上冷復易經日登佳

本草和名曰
猪蒙一名馬莖
生山谷陽處

新錄方治諸瘰癧方

露蜂房末酒服方寸匕

又方菟皮灰付之

又方芥子末付之

又方桃葉搗如泥封之

救急單驗方療諸瘰癧瘡方

莢楸枝茶淨洗瘡內孔中大驗

又方石留黃末置瘡孔中以艾灸五驗

陶景本草注諸瘰癧方

又方菟皮灰付之

又方芥子末付之

又方桃葉搗如泥封之

救急單驗方療諸瘰癧方

莢楸枝茶淨洗瘡內孔中大驗

又方石留黃末置瘡孔中以艾炷五驗

陶景本草注諸瘰癧方

玄參酒漬飲之良

又方鼯鼠蹄燒末酒服之

蘇敬本草注諸瘰癧方

本草拾遺曰菟馬莧搗指之

及馬齒陶以馬齒與菟同類

又方食雄宗良

崔禹錫食經諸瘰癧方

食一兩竹葢終身不病也

治狼瘡方第十七

病源論云狼瘡者年少之時不自謹慎或大怒氣

上不下之所生也始發之時在於頸項有根出缺盆上

轉連耳本根在肝

劉涓子方治狼瘡為病始發於頸腫有根起於缺盆

上轉連耳本此因憂毒氣上不得下

空青二分蝟螬脂二分蝟螬肝一具芎藭半分

獨活一分女婦草一分黃芩一分鼈龜甲一分

斑苗一分乾薑一分當歸一分蜀椒半枚

迴香一分煨石一分地膽半分

十五物搗下篩酒服方寸若酒勿令大醉日三

十五日服之

治鼠瘻方第十八

病源論云鼠瘻者飲食之時不擇食之毒而變化

斑苗
本草云甲上黃
黑斑也如巴豆大
者也

馬莧
新修本草云布地生實至
細俗呼為馬齒莧只可食小兒

班苗
本草云甲上黃
黑班也如巴豆大
者也

獨活一分 女婦草一分 黃耆一分 鼈甲一分
班苗一分 乾薑一分 當歸一分 蜀椒一枚

迴香一分 煨石一分 地膽半分

十五物搗下篩酒服方寸匕酒勿令大醉日三
十五日服之

治鼠瘻方第十八

病源論云鼠瘻者飲食之時不擇^ル虫虺之毒而變化
入於藏出於脉不去使人寒^シ其根在肺出於頸項

千金方療鼠瘻瘡^{タテ}後復發及不愈出膿血不^ル心方
以不中水猪脂吹咀主地黃^{イシ}內^{イシ}脂中令其脂与地

黃芝相淹和^{ヒタシ}藥六七沸^{ヒタシ}来^{ヒタシ}灰汁淨洗瘡去惡汁以

地黃膏塗上日一易

又云鼠瘻腫核痛未成膿方
以栢菜傳暑腫上^{ヒタシ}葵^{ヒタシ}塩^{ヒタシ}著^{ヒタシ}菜上熨之令^{ヒタシ}契^{ヒタシ}氣

下即消神良

又云治風瘻及鼠瘻方

赤小豆白飯黃耆牡蠣

凡四味等分酒服方寸匕日三

今案小品方加
黃芩治諸瘻

葛氏方治鼠瘻方

取^{カシラキ}白皮濃煮取二升服一升當吐^{ハク}鼠子

又方搗車前草^{オホハコ}以薄之

又方巴豆去心皮^{ヒナナカ}以和^{ヒナナカ}艾作^{ヒナナカ}炷^{ヒナナカ}灸瘡上

又方取小鼠子剥去皮^{ヒナナカ}炙^{ヒナナカ}令^{ヒナナカ}燥^{ヒナナカ}搗末以^{ヒナナカ}鴈月猪

膏和傳之

又云若已有口膿血出者以^{ヒナナカ}契^{ヒナナカ}牛矢塗之^{ヒナナカ}日三

范汪方治頸鼠瘻^{ヒナナカ}黑^{ヒナナカ}方

貝母二分 干薑一分 桂心一分 蜀椒一分

吳茱萸一分 葛本一分

又方巴豆去心皮以和艾作炷灸瘡上

又方取小鼯子剥去皮炙令燥搗末以鴈月猪

膏和傳之

又云若已有口膿血出者以契牛矢塗之曰三

范汪方治頸鼠瘻方

貝母二分 干薑一分 桂心一分 蜀椒一分

吳茱萸一分 葛根一分

凡六物治下節先食以酒服一撮良

錄驗方治鼠瘻及癰疽并瘰癧方 黃蘗二兩 凡二物治下節酒服方得瘰癧方 黃蘗二兩 令藥熱相繼初得癰即服良

劉涓子方治鼠瘻方

又方死蜋蜋燒作屑苦酒和塗之

汪心方治鼠瘻方

燒地黃葉帖上得差

又云鼯子瘻結核未破者用大針之元不差

治痿貼瘻方第十九

病源論云痿貼瘻者食菓茄子不避有虫即便散

食之有毒不去變化所生也在於頸上狀如鵝形隱瘻

而出其根在大腸

集驗方治痿貼瘻方

取痿貼瘻二七枚酒和傳上

千金方有痿貼瘻方

檮菜灰先以泔漬煮檮菜取汁洗拭干內灰

創中

劉涓子方治痿貼瘻始發於頸狀如腫此得之時食菓子

衣實毒不去核

龍骨半分 桂心一分 干薑一分 桔梗一分

煨石一分 附子一兩 獨活一分 苧藟半分

蜀椒一百枚

榲桲葉灰先以泔漬煮榲桲葉取汁洗棧干（オシル）內灰

劉涓子方治痿蝕痿始發於頸狀如腫此得之時食菓子
 菰實毒不去極

龍骨半分桂心一分干薑一分桔梗一分

樊石一分
附子一兩
獨活一分
芎藭半分

蜀櫟一百枚

右九物。搗下篩。別取干棗十枚。去核仇。合搗之。取酢漿和之。便得丸。日服五丸。如大豆。湯將水服之。アタマ

治蜂瘻方
菟朮

病源論云。蜂瘻者。食飲勞倦。渴乏多飲。流水即得。
蜂毒。不去。變化所生也。廿九發在頸癰。三四家俱腫。廿九

潰生創狀如癰形。羣而後移其根在脾。

劉涓子方治蜂螫始發於頸癰瘰三四處俱腫連
以潰移此得之多飲流水有蜂餘毒不去

蜂房一具
鼈甲一分
迴香子一分
茱萸一分

枰二百枚 千薑一分

右六物搗下作散傳創孔口上日十度

千金方有蜂痿方

人矢馳脫モトメ獵月楮膏和之付孔中

又方蜂窠灰臘月楮膏和付孔中

葛氏方云若著鼻ツル内外查瘤膿血出者是蜂虻取

軌
軌
蜂
房
火
笑
焦
末
溫
酒
眼
方
寸
上
日
一

治蛭蟥瘻方第廿一

病源論云。蛇蟠腰者。因寒腹中臈脹。所得寒毒不去。變化所生也。始發之時。在其頸項。使人狀若傷寒。有

仙艸 仙艸 本草和名曰
赤加比 虎古 仙字未詳

觥 古胡反論語云觥
禮器也一升曰爵
二升曰觥也
執 力食反
觥 執也
觥 公隹反觥執王侯
也

又方蜂窠灰臘月猪膏和付孔中

葛氏方云若著鼻内外查痛膿血出者是蜂瘻取

軌軌 本草和名曰
軌軌 本草和名曰
軌軌 本草和名曰

軌軌蜂房火炙焦末溫酒服方寸匕日一

治蛇蜂瘻方第廿一

病源論云蛇蜂瘻者目寒腹中腸脹所得寒毒不去

變化所生也始發之時在其頸項使人狀若傷寒有

幸 瘻瘻又
幸 瘻瘻又

以疥癬毒孔出其根在肺

劉涓子方治蛇蜂瘻始發於頸初得如傷寒此目食

中有蛇蜂毒不去

桃白皮一分 白朮四分 知母一分 雌黃一分 干地黄分

桐白皮一分 白朮四分 知母一分 雌黃一分 干地黄分

蠟皮四分 獨活一分 栝一百枚 青黛一分 斑苗一分

白芷一分 栝脂一分 夕藥一分 海基一分 當歸分

石十五物合搗作散下篩服一錢上日三病在裏

空腹服在外先食後服之又方元斑苗木

治蠱蝨瘻方第廿二

病源論云蠱蝨瘻者恐懼愁憂思慮失位不上餘毒

變化所生也始發之時在其頸項無頸尾如來板或

移動皮中使人寒熱心滿其根在心

劉涓子方云治蠱蝨瘻始發頸元頸尾如來板潰多

在人皮中使人寒熱心滿此因毒怒失位

空青二分 當歸二分 細辛一兩 干薑一分 用皮

苟杞根一分 斑苗一分 去地膽一分 干龜脂如三太豆

石八物合治下篩作散服方寸匕日三以酢將水下

散病在上倒輪臥在下高枕使藥流下

治浮疽瘻方第廿三

病源論云浮疽瘻者目甚結馳思往及變化所生始發

之時在於頸項亦板下如兩指元頸尾使人寒熱欲坐

地膽
本草曰狀如大馬蟻
有小翼子傍者即
斑苗所化狀如大豆

本草拾遺曰
青黛生鹹寒
無毒云從波斯
國來亦大厚
作

軌 古胡及論云軌
軌 軌也一升日軌
二升日軌也
軌 軌也一升日軌
軌 軌也一升日軌
軌 軌也一升日軌

地脈
本草曰狀如大馬蟻
有小翼子傷者即
斑苗所化狀如大豆

空青二分 當歸二分 細辛一兩 干薑一分用改

苟杞根一分 斑苗一分去 地膽一分 干龜脂如大豆大三

石八物合治下節作散服方寸匕日三服酢漿水下
散病在上倒輪臥在下高枕使藥流下七カセリイタセリ

治浮沮瘰方第十三

病源論云浮疽瘰者目眵結馳思往及變化所生始發

之時在於頸項亦腋在下如兩指元頸尾使人寒熱欲坐

其根在膽

劉涓子方治浮沮瘰始發於頸如兩指使人寒熱欲臥

得之目思慮憂滿其根在膽地脈主之甘草為佐方

石硫黃一分 干薑一分 龍膽草二分 細辛二分

地膽一分去 石決明一分去 續斷一分 大黃半分

陰蘆根一分

石九物下節傳瘡上日四五

治瘰癧瘰方第十四

病源論云瘰癧瘰者因強力入水坐湿地或新沐浴汗入

頭中流在頸上之所生也始發之時在其頸項恒有

膿使人寒熱其根在腎

劉涓子方治瘰癧瘰始發於頸有根令人寒熱此得之

新沐汁入頭中下流於頸

牡荖一兩 續斷一分 煨石二分 干地黄一分

空青一分 礬石一分 練干薑一分 桔梗一分

蜀椒一分 恒山皮一分 斑苗一分 烏鰂一分發

附子一合 炮干薑一分 干狸骨一分

右十五物搗合下節以白蜜和酒服如大豆十九

日再

治轉脈瘰方第十五

病源論云轉脈瘰者因飲酒大醉夜卧不安驚悸欲過

空青一分 礬石一分煉 干薑一分 桔梗一分
蜀椒一分 恒山皮一分又云クセキ 斑蝥一分 烏鰂一分蔡

附子一合炮 干薑一分 于狸宗一分

右十五物日再 搗令下篩以白蜜和酒服如大豆十九

治轉脈痿方第廿五

病源論云轉脈痿者因飲酒大醉夜卧不安驚悸欲過
轉側告枕之所生也始發之時在頸項濯之脈轉身始振
使人寒契其根在小腸

劉涓子方治轉脈痿始發於頸濯之脈轉身始振寒
契此得之驚卧去枕

桑青二分 人參二分 當歸二兩 升麻一分

麥門冬一兩心去 大黃二分 驢乳二分 桂心二兩

甘草半分 防風一分 白朮一分 地膽一分

續斷一分 麝香一分未 礬石半分生

右十五物令搗下篩麝香未 篩令更搗令調白

蜜和如大豆溫酒服十九日三勿食生菜生菓

胆如大豆溫酒服十九日三勿食生菜生菓肥

宗忌房內滿百日令得都老

治蜺頭痿方第廿六

病源論云蜺頭痿者由飲食居翹有蜺頭之毒氣入

於藏府流於經脈所生也初所生之時其狀如鼠

乳直下腫如覆斗而瘰癧搔之疼痛至百日有七八

孔入三寸中生蜺頭成尾自覆判人大如盂升至三

年斂人

千金方治蜺頭痿方

牛矢灰和臘月猪膏付之

又方契牛矢塗之

於藏府流於經脈所生也初所生之時其狀如鼠
乳直下腫如覆斗而瘰癧搔之疼痛至百日有七八
孔入三寸中生鼠頭成尾自覆判人大如盂升至三
年斂人

千金方治鼠頭瘰癧方

牛矢灰和臘月猪膏付之

又方煖牛矢塗之

治鼠頭瘰癧方第七

病源論云鼠頭瘰癧者由居飢飲食有鼠頭之氣或因飲
食入腹內流於經脈所生其根在大腸其狀腫核潰行
漏之

集驗方鼠頭瘰癧方

取獐胎二七枚酒和傳瘡上

劉涓子方治鼠頭瘰癧方

鴨膏和胡椒傳瘡已靈

千金方有鼠頭瘰癧方

甄別夫鷄矢末之以二月杜脂下頷髓和付

治蟻瘰癧方第十八

病源論云蟻瘰癧者由飲食有蟻精氣毒入於五藏流
出注脈多者頸項戢戢創少腫核細而乃遍身疥

集驗方蟻瘰癧方

半复一果搗作屑以鴨膏和傳瘡上

千金方蟻瘰癧方

蝟皮肝心灰末酒服一錢上

又方雄鷄灰末付之

又方鼠灰付之

葛氏方若瘡多而孔少者是蟻瘰

燒陵鯉鯉甲猪膏和傳佳

半复一果。搗作屑。以鴨膏和。傅瘡上。

千金方蟻瘻方

クセフ 蟬皮。肝心灰。末。酒服一錢上。

又方。雄鷄灰。未付之。

又方。鼠屎。付之。

葛氏方。若瘡多而孔少者。是蟻瘻。

本草曰。似蟻而小。短小。又似雞。更有四足。能勝能水。

燒。陸鯉。鯉甲。猪膏。和。傅佳。

治蝎瘻方第廿九

胡芎藭及五苓中。主蝎瘻也。

病源論云。蝎瘻者。飲食居處。有蝎之毒氣入於藏。

流於注脈。或生腋下。或生頸邊。腫起如蝎虫之形。

寒熱而潰。成瘻。久則創裏生細蝎。

千金方有蝎瘻五孔六孔。皆相通方。

搗芎根汁。著內孔中。

治蝦蟆瘻方第卅

病源論云。蝦蟆瘻者。飲食有蝦蟆之毒氣入於藏。

流於注脈。結腫。寒熱。因潰。成瘻。服藥有物。隨小便。

出。如蝦蟆之狀。

千金方有蝦蟆瘻方。

五月五日。馳豚及野猪。脂。付水。衣付。三佳。

治蛙瘻方第卅一

病源論云。蛙瘻者。飲食居處。有蛙之毒氣入於藏。

流於注脈。而成瘻。因服藥。隨小便。出物。狀如蛙形。

千金方有蛙瘻方。

治蛇瘻方第卅二

馳腹中蛙灰。付之。

病源論云。蛇瘻者。居處。飲食。有蛇毒氣入於藏。流。

於脈。寒熱。結腫。出物。無定。因潰。成瘻。服藥有物。隨。

小便。出。如蛇形。

流於經脈而成痿因服藥隨小便出物狀如蛙形
千金方有蛙痿方

蛇腹中蛙灰付之

治蛇痿方第卅二

病源論云蛇痿者居處飲食有蛇毒氣入於藏流於脈寒熱結腫出物無定因潰成痿服藥有物隨小便出如蛇形

千金方有蛇痿方

蛇脫天臘月猪脂和付之

治螳螂痿方第卅三

病源論云螳螂痿者由居處飲食有螳螂之毒氣入於藏流於經脈所生初得之時如棗核許或滿百日或滿周年走不一處或孔膿汁潰漏

千金方有螳螂痿方

搗依根付至老填口味

治雀痿方第卅四

病源論云雀痿者居處飲食有雀之毒氣入於藏流於經脈無定處因潰成痿服藥有物隨小便出狀如雀穀

千金方有雀痿方

女猪矢灰和臘月猪膏付出如雀

治石痿方第卅五

病源論云石痿之初狀起兩頭如梅季核新實案之強如石而寒熱狀一後潰成痿

千金方有石痿從兩頭出者其狀堅實令人寒熱方

以大敗針破之鼠粘草二分末和鷄子一枚付之

又方搗槐子和井華水付之

本草拾遺曰井華水味月平辛

母猪矢灰和臘月猪膏付出如雀

治石瘰方第卅五

病源論云石瘰之初狀起兩頭如梅季核新實案之強如石而寒熱然一後潰成瘰

千金方有石瘰從兩頭出者其狀堅實令人寒熱方

以大敗針破之鼠黏草二分末和鷄子一枚付之

又方搗槐子和井華水付之

治風瘰方第卅六

病源論云風瘰者由風邪在經脈之結聚所成也

心方治風瘰鼠瘰方

來自皮七八分細剉水二斗煮取汁一斗更煎汁

取二升半頓服下至老

又方燒地黃葉枯上得老

又方杏仁一升炙搗和生猪脂傅上

千金方風瘰及鼠瘰方

赤豆 白飯 黃耆 牡蠣

四味等分酒服方寸匕日三

治內瘰方第卅七

病源論云內瘰者人有發創色黑有結內有膿久乃

潰出侵食筋骨謂之內瘰

取槐白皮十兩搗丸綿裹內下部驗

又方剪楸葉作葉相堪丸以竹筒內下部封

痔瘰者老

治膿瘰方第卅八

病源論云諸瘰皆有膿汁此獨膿為名者是諸創

久不愈成瘰而重為契氣所乘毒氣停積生膿

常不絕故謂之膿瘰

千金方有膿瘰方

本草拾遺曰井華水味甘平無毒云

文選江賦云洪蚺專事注曰洪蚺似蛤大者四五寸獨死一事故云專事

唐韻平談及蚌屬狀如蛤圓而厚外有硬殼橫身今

音与瘰字同若通用欵

又選江賦云洪蚶
專事注曰洪蚶似
蛤大者四五寸獨
死一事故云專事
收冬多瘡汁也

痔瘻志卷上

唐韻平談及蟬屬狀如蛤
圓而厚外有硬縱橫脊中
刺也

治膿瘻方第卅八

病源論云諸瘻皆有膿汁此獨膿為名者是諸創

久不愈成瘻而重為契氣所乘毒氣停積生膿

常不絕故謂之膿瘻

千金方有膿瘻方

桃花末和猪脂付之

又方搗麴和燒灰付之

龍門方瘻膿出方

石流黃末置瘡孔中以艾炷灸之

本草瘻膿出方

楊盧木水煮葉汁洗之

治冷瘻方第卅九

病源論云冷瘻者亦是諸創得風冷久不愈因成

瘻膿汁不絕故為冷瘻

千金方凡一切冷瘻方

燒人吐出蚶虫灰先甘草湯洗瘻後著灰無

不老者慎口味

玉篇云蚶虫
同字
宋韻云蚶人
腹中長蟲
養生妙法食雞鰾
昂勿飲水生烟虫

醫心方卷第十六